

[KOP] De vele variaties van halsklierdissectie

[INTRO]

Het verwijderen van lymfeklieren in de hals, ofwel halsklierdissectie, kent veel verschillende variaties. Deze zijn gebaseerd op de uitgebreidheid van de ingreep. De oude naamgeving voor de verschillende varianten wordt steeds meer verlaten: tegenwoordig beschrijven we welke levels zijn geopereerd en welke structuren (anders dan lymfeklieren) zijn verwijderd. In dit artikel een kort overzicht van de verschillende chirurgische mogelijkheden.

Tekst: Annemarie Vesseur, KNO-arts / hoofd-halschirurg Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Bronvermelding

'Kanker in Nederland, trends en prognoses tot en met 2032' IKNL; <https://iknl.nl/kanker-in-2032>

Shah J.; Jatin Shah's Head and neck Surgery and Oncology 5th edition; Chapter 11; Elsevier
Figuur 1 <https://iknl.nl/kankersoorten/hoofd-halskanker>

Figuur 2 <https://radiopaedia.org/articles/lymph-node-levels-of-the-neck>

Figuur 3 Levels of the neck and classification of neck dissection and incisions; Sciscent, Bao Y. et al.; Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Volume 35, Issue 4, 297 - 303